



## UNIDAD DE MICOBACTERIAS

CÓDIGO CIB	PRUEBA	TÉCNICA	MUESTRA	VOLUMEN MÍNIMO	INDICACIONES TOMA DE MUESTRA	EMBALAJE, TRANSPORTE Y ENTREGA	TIEMPO DE ENTREGA DEL RESULTADO	DÍAS DE PROCESAMIENTO
B51	Determinación de niveles séricos de antituberculosos: ciprofloxacina, isoniazida, etionamida, levofloxacina y rifampicina	HPLC	Suero: su envío debe hacerse en tubo tapa roja rosca estéril o con tapa hermética estéril	4 mL / medicamento	Sangrar al paciente cuando este lleve al menos una semana de tratamiento continuo. Si se requiere evaluar niveles pico lo ideal es realizar la sangría dos horas posterior a la administración del medicamento, si se requiere evaluar niveles valle por ejemplo en casos de evaluación de adherencia, la sangría debe hacerse antes de la administración de la siguiente dosis. Separar el suero en condiciones de esterilidad para su envío. Se deberá adjuntar el formato F-03-0012 completamente diligenciado.	Enviar el suero a temperatura que debe estar entre 2 - 8°C, cumpliendo las normas de embalaje de la IATA (UN 3373 SUSTANCIA BIOLÓGICA CATEGORÍA B)	3 a 5 días	Martes y jueves